Lista de comprobación de la **disposición del paciente para abandonar el centro sanitario**

Spravato® esketamina spray nasal

SPRAVATO® debe ser administrado bajo la supervisión directa de un médico. Una sesión de tratamiento consiste en la administración intranasal de SPRAVATO® y en la observación posterior a la administración bajo supervisión.[*1]

Esta Lista de requisitos, tiene como objetivo, **ayudar al médico responsable a decidir si** tras la administración de este medicamento, **un paciente está preparado para abandonar el centro sanitario.**

En especial, esta lista hace hincapié en los cuatro riesgos asociados a este tratamiento, que se le han explicado detalladamente en la Guía adjunta. **El paciente no debe presentar ninguno de estos eventos, o cualquier síntoma sugestivo de estos, para poder abandonar el centro médico.**

El profesional sanitario responsable de la administración de **SPRAVATO®** debe comprobar que:

1. El paciente no presenta signos de disociación o cambios en la percepción de la realidad ☐
2. El paciente está totalmente despierto y responde a estímulos (es decir, no experimenta una alteración en el nivel de consciencia) ☐
3. El paciente presenta valores aceptables de presión arterial ☐
4. En caso de que el paciente haya presentado otros eventos adversos (náuseas, dolor de cabeza, etc), estos se han resuelto ☐
5. Se le ha recomendado al paciente que no conduzca ni maneje maquinarias hasta después de haber descansado adecuadamente tras la administración de Spravato® ☐
6. Se le ha recomendado que el paciente deberá organizar el traslado a su hogar después del tratamiento con SPRAVATO® ☐

Por último, como médico responsable de este tratamiento, según su criterio médico, y con la ayuda de esta lista **¿considera que el paciente está listo para abandonar el centro?** ☐

[*1]Prospecto Spravato

janssen
PHARMACEUTICAL COMPANIES OF Johnson & Johnson

Algoritmo de soporte vital básico en adultos

1 Confirmar la seguridad de la escena

2

- Comprobar si la víctima responde
- Pedir ayuda en voz alta a las personas que se encuentran cerca
- Activar el sistema de respuesta a emergencias a través de un dispositivo móvil (si es posible)
- Obtener un DEA y equipo para emergencias (o enviar a otra persona para que lo traiga)

3

Comprobar si la víctima no respira o solo jadea/boquea y comprobar el pulso (al mismo tiempo). ¿Se detecta pulso **con certeza** al cabo de 10 segundos?

La respiración es normal; se detecta pulso

3a

Controlar hasta que lleguen los reanimadores de emergencias

La respiración es anormal; se detecta pulso

3b

- Proporcionar ventilación de rescate: realizar una ventilación cada 6 segundos o 10 ventilaciones por minuto
- Comprobar el pulso cada 2 minutos; si no hay pulso, se debe iniciar la RCP
- Si se sospecha la presencia de sobredosis de opiáceos, administrar naloxona si está disponible siguiendo el protocolo

No hay respiración o solo hay jadeos/boqueos; no se detecta pulso

En este punto, en todos los escenarios se activa el sistema de respuesta a emergencias o la asistencia y se busca un DEA y equipo de emergencias o se pide a alguien que lo traiga

4

Iniciar RCP

- Realizar ciclos de 30 compresiones y 2 ventilaciones
- Utilizar el DEA tan pronto como esté disponible

5 El dEA llega

6 Comprobar el ritmo ¿El ritmo es desfibrilable?

Sí, es desfibrilable

7

- Administrar 1 descarga. Reanudar la RCP de inmediato durante 2 minutos (hasta que lo indique el DEA para permitir la comprobación del ritmo)
- Continuar hasta que lo sustituyan los profesionales de soporte vital avanzado o la víctima comience a moverse

No, no es desfibrilable

8

- Reanudar la RCP de inmediato durante 2 minutos (hasta que lo indique el DEA para permitir la comprobación del ritmo)
- Continuar hasta que lo sustituyan los profesionales de soporte vital avanzado o la víctima comience a moverse

© 2020 American Heart Association

Janssen
PHARMACEUTICAL COMPANIES OF Johnson & Johnson

Acceda al prospecto de SPRAVATO® escaneando el código QR en su dispositivo móvil.

Acceda también a la información para prescribir en la sección de productos de www.janssen.com

Para reporte de eventos adversos, quejas de calidad por favor contactarse a **Infojanssen@janar.jnj.com** y/o al **0800-122-0238.**

MATERIAL EXCLUSIVO PARA USO DEL PROFESIONAL MÉDICO

©Janssen Cilag Farmacéutica S.A. 10, 2023 //EM-141386