

Bloedtest voor leverfunctie bepaling

Bij sommige patiënten die Tracleer innamen, werd een abnormale leverfunctie waargenomen. Tijdens de behandeling met Tracleer zal uw arts zorgen voor regelmatige controles van uw bloed om uw leverfunctie te controleren.

→ **Denk er aan om iedere maand een bloedtest voor de controle van uw leverfunctie te laten uitvoeren. Twee weken na een verhoging van de dosering moet een extra test worden uitgevoerd.**

Datum van de eerste maandelijkse test:

Uw schema voor maandelijkse leverfunctietests:

jan	feb	mrt	apr
mei	jun	jul	aug
sep	okt	nov	dec

Tracleer bosentan

Patiëntenwaarschuwingskaart RMA: 07/2022

Belangrijke veiligheidswaarschuwingen voor patiënten die Tracleer (bosentan) gebruiken

Deze kaart bevat belangrijke informatie over Tracleer. Leest u deze kaart zorgvuldig vóór u begint met uw behandeling met Tracleer.

Uw naam:

Behandelend arts:

Neem bij vragen over Tracleer contact op met uw arts.

Indien u een vrouw bent die zwanger kan worden, lees dan deze pagina zorgvuldig

Zwangerschap

Tracleer kan schade toebrengen aan de ontwikkeling van de foetus. Daarom mag u geen Tracleer gebruiken als u zwanger bent en mag u ook niet zwanger worden als u Tracleer gebruikt.

Bovendien, indien u lijdt aan pulmonale hypertensie, kan zwangerschap de symptomen van uw ziekte ernstig versterken. Indien u vermoedt dat u zwanger bent, vertel dit aan uw arts of aan uw gynaecoloog.


Janssen-Cilag International NV MU_186141

Anticonceptie

Hormonale voorbehoedsmiddelen – zoals orale anticonceptiva, de pil, hormooninjecties, implantaten of anticonceptiepleisters – zijn niet betrouwbaar bij het voorkomen van een zwangerschap bij vrouwen die Tracleer gebruiken. U dient tevens een barrièremethode te gebruiken – zoals condoom, pessarium of vaginale spons – naast de genoemde vormen van hormonale voorbehoedsmiddelen. Bespreek iedere eventuele vraag met uw arts of uw gynaecoloog – vul de achterzijde van deze kaart in en geef deze aan uw arts of gynaecoloog bij de volgende afspraak.

U dient een zwangerschapstest te doen vóór u met Tracleer begint en vervolgens iedere maand van de behandeling, zelfs als u denkt dat u niet zwanger bent.

Datum van de eerste maandelijkse test:




Anticonceptie

Gebruikt u momenteel voorbehoedsmiddelen?

Ja Nee

Indien ja, noteer dan hier de namen van deze middelen:

Neem deze kaart mee naar uw arts of gynaecoloog bij uw volgende bezoek en hij/zij zal u adviseren over de noodzaak om aanvullende of alternatieve anticonceptiemethoden te gebruiken.

Card TRACLEER PCC: MU_186141	Product Artwork CoE			
	Shared mailbox: RA-JANBE-GRAPHDES@its.jnj.com			
<i>Template Ref. Name:</i> Allpack/Card/262mm5x35/V1 <i>Tech. info/Spec:</i> N/A <i>Market:</i> BE-NL-LU <i>Mat. ID Code:</i> N/A <i>File Name:</i> MU_186141.ai (CC-PC) <i>Replaces PCC:</i> N/A	<input type="checkbox"/> PMS 389	<input type="checkbox"/> Diecut (not to be printed)	<i>Date (Designer)</i> 1. 04-JUL-22 (Lief) 2. 02-SEP-22 (Ariane)	
	<input type="checkbox"/> PMS 7463			
	<input type="checkbox"/> PMS 485			
	<input type="checkbox"/> Black			