PHARMACEUTICAL COMPANIES OF Johnson-Johnson

Janssen Oncology

Janssen-Cilag NV

©Janssen-Cilag NV – CP-133946 – fév-2022 – vu/er Luc Van Oevelen, Antwerpseweg 15-17, 2340 Beerse

INFORMATIONS
MÉDICALES IMPORTANTES

RMA version 02/2022

DARZALEX® daratumumab

Carte d'information patient

Lisez attentivement la notice avant d'utiliser le médicament Darzalex®.

Numéro de téléphone :

Nom du médecin / Nom de l'hôpital

En cas d'urgence, ou si vous trouvez cette carte, veuillez contacter le médecin suivant :

PATIENTS traités par daratumumab :
AVANT toute transfusion sanguine, montrez cette carte aux professionnels de santé. Cette carte doit être conservée sur vous et présentée jusqu'à 6 mois après l'arrêt du traitement.

Nom : _____

Je reçois actuellement le médicament suivant :
daratumumab, anticorps monoclonal
pour le traitement du myélome multiple.

J'ai arrêté ce traitement le :
_____ / _____ / _____
JJ MM AAAA

Cher professionnel de santé,
Daratumumab est associé à un risque d'interférence avec les examens immuno-hématologiques. Le test de Coombs indirect (test indirect à l'antiglobuline [TIA]) peut restituer un résultat positif chez les patients traités par daratumumab, même en l'absence d'anticorps contre les antigènes mineurs sanguins dans le sérum du patient. Cette interférence peut persister jusqu'à 6 mois après la dernière perfusion. La détermination du groupe ABO et du Rhésus du patient n'est pas affectée.
En cas de transfusion urgente, des concentrés de globules rouges ABO/RhD compatibles, sans épreuve de compatibilité croisée, peuvent être administrés, conformément aux pratiques locales des banques de sang.
Pour plus d'information, vous pouvez contacter le Service Clients Janssen (par téléphone au 0800 93 377 ou par e-mail via janssen@jacbe.jnj.com) ou utiliser le document de référence suivant comme source d'information additionnelle :
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/trf.13069/epdf
Des renseignements supplémentaires concernant l'interférence avec les tests de compatibilité sanguine peuvent être consultés sur le site www.afmps.be (Onglet 'Information pour le professionnel' →'Matériels RMA approuvées').

Avant de commencer daratumumab, mes résultats de tests sanguins, collectés le _____ / _____ / _____ étaient :
JJ MM AAAA

Groupe sanguin : ☐ A ☐ B ☐ AB ☐ O ☐ RhD+ ☐ RhD-

Le test de Coombs indirect (dépistage des anticorps) était :

☐ négatif ☐ positif pour les anticorps suivants :

_____

Autres : _____

Coordonnées de l'établissement où les tests sanguins ont été effectués : _____