

INFORMATIONS MÉDICALES IMPORTANTES

RMA version 01/2019

DARZALEX[®] daratumumab

solution à diluer pour perfusion

▼ **Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire.**

Carte d'information patient

Lisez attentivement la notice avant d'utiliser le médicament Darzalex[®].

Numéro de téléphone :

Nom du médecin / Nom de l'hôpital

En cas d'urgence, ou si vous trouvez cette carte, veuillez contacter le médecin suivant :

PATIENTS traités par daratumumab :

AVANT toute transfusion sanguine, montrez cette carte aux professionnels de santé. Cette carte doit être conservée sur vous et présentée jusqu'à 6 mois après l'arrêt du traitement.

Nom : _____

Je reçois actuellement le médicament suivant :

daratumumab, anticorps monoclonal
pour le traitement du myélome multiple.

J'ai arrêté ce traitement le :

____ / ____ / ____
JJ MM AAAA

Cher professionnel de santé,

Daratumumab est associé à un risque d'interférence avec les examens immuno-hématologiques. Le test de Coombs indirect (test indirect à l'antiglobuline [TIA]) peut restituer un résultat positif chez les patients traités par daratumumab, même en l'absence d'anticorps contre les antigènes mineurs sanguins dans le sérum du patient. Cette interférence peut persister jusqu'à 6 mois après la dernière perfusion. La détermination du groupe ABO et du Rhésus du patient n'est pas affectée.

En cas de transfusion urgente, des concentrés de globules rouges ABO/RhD compatibles, sans épreuve de compatibilité croisée, peuvent être administrés, conformément aux pratiques locales des banques de sang.

Pour plus d'information, vous pouvez contacter le Service Clients Janssen (par téléphone au 800 29 504 ou par e-mail via janssen@jacbe.jnj.com) ou utiliser le document de référence suivant comme source d'information additionnelle : <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/trf.13069/epdf>

Avant de commencer daratumumab, mes résultats de tests sanguins, collectés le ____ / ____ / ____ étaient :

JJ MM AAAA

Groupe sanguin : A B AB O RhD+ RhD-

Le test de Coombs indirect (dépistage des anticorps) était :

négatif positif pour les anticorps suivants :

Autres : _____

Coordonnées de l'établissement où les tests sanguins ont été effectués : _____