

01

USE A ÁREA HACHURADA PARA GRAMPEAR/COLAR TODAS AS PÁGINAS

CARTÃO DO PACIENTE

TECVAYLI™
(teclistamabe)

NOME DO PACIENTE:

janssen  Oncology
PHARMACEUTICAL COMPANIES OF Johnson & Johnson

02

USE A ÁREA HACHURADA PARA GRAMPEAR/COLAR TODAS AS PÁGINAS



ATENÇÃO

É importante que qualquer profissional da saúde que você tenha contato esteja ciente que você está em tratamento com **TECVAYLI™ (teclistamabe)**. **Por isso, leve este cartão sempre com você. Principalmente caso você vá ao hospital.**

O medicamento TECVAYLI™ (teclistamabe) pode causar efeitos colaterais, como Síndrome de Liberação de Citocina (SLC).¹ A Síndrome de Liberação de Citocinas é uma reação imune grave que pode ser desencadeada por uma variedade de fatores, incluindo medicamentos como TECVAYLI™ (teclistamabe).^{1,2}

03



INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA IMPORTANTE PARA PACIENTES

Você está em um tratamento para câncer e por isso é importante que esteja atento a alguns sinais e sintomas, especialmente nas primeiras semanas de tratamento. **Procure ajuda médica imediatamente caso você sinta:**^{2,3,4}

Febre (38 °C ou mais)
Calafrios
Batimento acelerado
Dificuldade para respirar

Náusea
Dor de cabeça
Tontura
Pressão baixa

IMPORTANTE LEMBRAR:

Após a administração de suas 3 primeiras doses (geralmente dentro do cronograma de escalonamento de dose), permaneça próximo (ou seja, em até 30 minutos de distância) por pelo menos 48 horas, do local onde você recebeu a terapia com TECVAYLI™ (teclistamabe).¹ É recomendado que você esteja na companhia de um adulto competente para monitoramento diário.¹ **Estes não são todos os efeitos colaterais do TECVAYLI™. Caso tenha qualquer sintoma listado neste cartão, ligue para seu médico ou procure um pronto-socorro imediatamente.**¹

Avise seu médico caso você tenha qualquer outro sintoma/efeito colateral que te incomode ou que persista.¹

MÉDICO PRESCRITOR

**NOME DO MÉDICO
PRESCRITOR:**

**NÚMERO DO TELEFONE
DO MÉDICO PRESCRITOR:**

**NOME E ENDEREÇO
DO HOSPITAL:**

**NÚMERO DO TELEFONE
DO HOSPITAL:**

USE A ÁREA HACHURADA PARA GRAMPEAR/COLAR TODAS AS PÁGINAS

04



INFORMAÇÃO PARA A EQUIPE DE CUIDADO DE SAÚDE PREENCHER

Por favor, forneça este cartão à sua equipe de cuidado à saúde para preencher as informações e te retornar com o cartão preenchido após administração de TECVAYLI™ (teclistamabe).

Datas das doses de TECVAYLI™ (teclistamabe) - Cronograma de escalonamento:

DOSE DE ESCALONAMENTO 1

 / /

DOSE DE ESCALONAMENTO 2

 / /

PRIMEIRA DOSE DE TRATAMENTO

 / /

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA IMPORTANTE AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Síndrome de Liberação de Citocinas (SLC), incluindo reações fatais ou de ameaça à vida, podem ocorrer em pacientes recebendo TECVAYLI™ (teclistamabe).¹

A maioria dos eventos de Síndrome de Liberação de Citocinas (SLC) observados após a administração de TECVAYLI™ (teclistamabe) foram graus 1 e 2.⁵

Síndrome de Liberação de Citocinas (SLC) pode envolver vários sistemas de órgãos.²

Avalie o paciente para sinais de Síndrome de Liberação de Citocinas (SLC).¹

Se o seu paciente relatar ou apresentar quaisquer sinais ou sintomas conforme referidos neste cartão, por favor, entre em contato com o médico prescritor do paciente imediatamente para mais informações.

Consulte a bula atual para mais detalhes e informação de contato do fabricante.¹

USE A ÁREA HACHURADA PARA GRAMPEAR/COLAR TODAS AS PÁGINAS

01

USE A ÁREA HACHURADA PARA GRAMPEAR/COLAR TODAS AS PÁGINAS

**ESTE MEDICAMENTO ESTÁ SUJEITO
A MONITORAMENTO ADICIONAL.
ISSO PERMITIRÁ IDENTIFICAÇÃO MAIS
RÁPIDA DE NOVAS INFORMAÇÕES DE
SEGURANÇA.**

REFERÊNCIAS

01 Bula TECVAYLI™ (teclistamabe).

02 Shimabukuro-Vornhagen A., et al. Cytokine release syndrome. J Immunother Cancer. 2018 Jun 15;6(1):56. Doi: 10.1186/s40425-018-0343-9.

03 Riegler L.L., et al. Current approaches in the grading and management of cytokine release syndrome after chimeric antigen receptor T-cell therapy. Ther Clin Risk Manag. 2019 Feb 28;15:323-335. Doi: 10.2147/TCRM.S150524.

04 Lee D.W., et al. ASTCT Consensus Grading for Cytokine Release Syndrome and Neurologic Toxicity Associated with Immune Effector Cells. Biol Blood Marrow Transplant. 2019 Apr;25(4):625-638. doi: 10.1016/j.bbmt.2018.12.758.

05 Moreau P., et al. Teclistamab in Relapsed or Refractory Multiple Myeloma. N Engl J Med. 2022 Aug 11;387(6):495-505. doi: 10.1056/NEJMoa2203478. Epub 2022 Jun 5. PMID: 35661166.

janssen Oncology
PHARMACEUTICAL COMPANY OF JANSSEN-ILUMINATE

INFOC
Informações Científicas
infoc@janbr.jnj.com

SAFE Janssen
Serviço de Atendimento Especializado em Farmacovigilância
safe@janbr.jnj.com
0800 7011 851



ACESSE A BULA

Material destinado a pacientes que receberem a prescrição de TECVAYLI™ (teclistamabe).
Produzido em julho de 2023 - EM-134333.