



































| Spécialité (substance active) | Pictogramme grossesse associé |
|--|--|
| ARESTAL 1 MG, COMPRIME (Oxyde de l'opéramide) |  <p>ARESTAL + GROSSESSE = DANGER Ne pas utiliser chez la femme enceinte, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique</p> |
| CAELYX 2 MG/ML, SOLUTION A DILUER POUR PERFUSION (Chlorhydrate de doxorubicine sous forme liposomale pegylée) |  <p>CAELYX + GROSSESSE = DANGER Ne pas utiliser chez la femme enceinte et chez l'adolescente ou la femme en âge de procréer et sans contraception efficace, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique</p> |
| CONCERTA LP 18 MG, COMPRIME A LIBERATION PROLONGEE CONCERTA LP 36 MG, COMPRIME A LIBERATION PROLONGEE CONCERTA LP 54 MG, COMPRIME A LIBERATION PROLONGEE (Chlorhydrate de méthylphénidate) |  <p>CONCERTA + GROSSESSE = DANGER Ne pas utiliser chez la femme enceinte, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique</p> |
| DACOGEN 50 MG, POUDRE POUR SOLUTION A DILUER POUR PERFUSION (Décitabine) |  <p>DACOGEN + GROSSESSE = INTERDIT Ne pas utiliser chez la femme enceinte et chez l'adolescente ou la femme en âge de procréer et sans contraception efficace</p> |
| DAKTARIN 2 POUR CENT, POUDRE POUR APPLICATION LOCALE (Miconazole) | Pas de pictogramme grossesse |
| DAKTARIN 2 %, GEL BUCCAL (Miconazole) |  <p>DAKTARIN + GROSSESSE = DANGER Ne pas utiliser chez la femme enceinte, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique</p> |
| DARZALEX 20 MG/ML SOLUTION A DILUER POUR PERFUSION (Daratumumab) |  <p>DARZALEX + GROSSESSE = DANGER Ne pas utiliser chez la femme enceinte et chez l'adolescente ou la femme en âge de procréer et sans contraception efficace, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique</p> |
| DUROGESIC 12 MICROGRAMMES/HEURE, DISPOSITIF TRANSDERMIQUE DUROGESIC 25 MICROGRAMMES/HEURE, DISPOSITIF TRANSDERMIQUE DUROGESIC 50 MICROGRAMMES/HEURE, DISPOSITIF TRANSDERMIQUE DUROGESIC 75 MICROGRAMMES/HEURE, DISPOSITIF TRANSDERMIQUE DUROGESIC 100 MICROGRAMMES/HEURE, DISPOSITIF TRANSDERMIQUE (Fentanyl) |  <p>DUROGESIC + GROSSESSE = DANGER Ne pas utiliser chez la femme enceinte, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique</p> |
| EDURANT 25 MG, COMPRIME PELLICULE (Rilpivirine) | Pas de pictogramme grossesse |
| EPITOMAX 50 MG, COMPRIME PELLICULE EPITOMAX 100 MG, COMPRIME PELLICULE EPITOMAX 200 MG, COMPRIME PELLICULE EPITOMAX 15 MG, GELULE EPITOMAX 25 MG, GELULE EPITOMAX 50 MG, GELULE (Topiramate) |  <p>EPITOMAX + GROSSESSE = INTERDIT Ne pas utiliser chez la femme enceinte et chez l'adolescente ou la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace.</p> |
| EPREX 10 000 UI/ML, SOLUTION INJECTABLE EN SERINGUE PRÉREMPLIE EPREX 2 000 UI/ML, SOLUTION INJECTABLE EN SERINGUE PRÉREMPLIE EPREX 4 000 UI/ML, SOLUTION INJECTABLE EN SERINGUE PRÉREMPLIE EPREX 40 000 UI/ML, SOLUTION INJECTABLE EN SERINGUE PRÉREMPLIE (Epoétine alpha) |  <p>EPREX + GROSSESSE = DANGER Ne pas utiliser chez la femme enceinte, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique</p> |
| EVRA, DISPOSITIF TRANSDERMIQUE (Ethinylestradiol + Norelgestromine) |  <p>EVRA + GROSSESSE = DANGER Ne pas utiliser chez la femme enceinte</p> |

| Spécialité (substance active) | Pictogramme grossesse associé |
|---|--|
| FENTANYL JANSSEN 100 MICROGRAMMES/2 ML, SOLUTION INJECTABLE AMPOULE FENTANYL JANSSEN 500 MICROGRAMMES/10 ML, SOLUTION INJECTABLE AMPOULE <i>(Citrate de fentanyl)</i> |  <p>FENTANYL + GROSSESSE = DANGER Ne pas utiliser chez la femme enceinte (excepté pour l'analgésie péridurale pendant l'accouchement), sauf en l'absence d'alternative thérapeutique</p> |
| GYNO-DAKTARIN 400 MG, CAPSULE MOLLE VAGINALE <i>(Nitrate de miconazole)</i> | <p><i>Pas de pictogramme grossesse</i></p> |
| GYNO-PEVARYL 150 MG, OVULE GYNO-PEVARYL LP 150 MG, OVULE A LIBERATION PROLONGEE <i>(Nitrate d'éconazole)</i> |  <p>GYNO PEVARYL + GROSSESSE = DANGER Ne pas utiliser chez la femme enceinte, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique</p> |
| HALDOL 1 MG, COMPRIME HALDOL 5 MG, COMPRIME HALDOL 2 MG/ML, SOLUTION BUVABLE HALDOL 5 MG/ML, SOLUTION INJECTABLE EN AMPOULE <i>(Halopéridol)</i> |  <p>HALDOL + GROSSESSE = DANGER Ne pas utiliser chez la femme enceinte, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique</p> |
| HALDOL DECANOAS, SOLUTION INJECTABLE <i>(Halopéridol)</i> |  <p>HALDOL DECANOAS + GROSSESSE = DANGER Ne pas utiliser chez la femme enceinte, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique</p> |
| HYPNOMIDATE 2 MG/ML, SOLUTION INJECTABLE <i>(Etomidate)</i> |  <p>HYPNOMIDATE + GROSSESSE = DANGER Ne pas utiliser chez la femme enceinte, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique</p> |
| IMBRUVICA 140 MG, GELULE <i>(Ibrutinib)</i> |  <p>IMBRUVICA + GROSSESSE = INTERDIT Ne pas utiliser chez la femme enceinte et l'adolescente ou la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace.</p> |
| IMODIUM 0,2 MG/ML, ENFANTS SOLUTION BUVABLE IMODIUM 2 MG, GELULE <i>(Chlorhydrate de loperamide)</i> |  <p>IMODIUM + GROSSESSE = DANGER Ne pas utiliser chez la femme enceinte, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique</p> |
| INTELENCE 25 MG, COMPRIME INTELENCE 100 MG, COMPRIME INTELENCE 200 MG, COMPRIME <i>(Etravirine)</i> | <p><i>Pas de pictogramme grossesse</i></p> |
| KETODERM 2%, CRÈME KETODERM 2%, GEL EN SACHET <i>(Kétoconazole)</i> | <p><i>Pas de pictogramme grossesse</i></p> |
| LEUSTATINE 1 MG/ML, SOLUTION POUR PERFUSION <i>(Cladribine)</i> |  <p>LEUSTATINE + GROSSESSE = DANGER Ne pas utiliser chez la femme enceinte et chez l'adolescente ou la femme en âge de procréer et sans contraception efficace, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique</p> |
| MOTILIUM 10 MG, COMPRIME PELLICULE MOTILIUM 1 MG/ML, SUSPENSION BUVABLE <i>(Dompéridone)</i> |  <p>MOTILIUM + GROSSESSE = DANGER Ne pas utiliser chez la femme enceinte, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique</p> |
| OLYSIO 150 MG, GELULE <i>(Siméprévir)</i> |  <p>OLYSIO + GROSSESSE = DANGER Ne pas utiliser chez la femme enceinte et chez l'adolescente ou la femme en âge de procréer et sans contraception efficace, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique</p> |
| PARIET 10 MG, COMPRIME GASTRO-RESISTANT PARIET 20 MG, COMPRIME GASTRO-RESISTANT <i>(Rabéprazole sodique)</i> |  <p>PARIET + GROSSESSE = INTERDIT Ne pas utiliser chez la femme enceinte.</p> |

| Spécialité (substance active) | Pictogramme grossesse associé |
|--|---|
| PEVISON, CRÈME (Nitrate d'éconazole + acétonide de triamcinolone) | <i>Pas de pictogramme grossesse</i> |
| PREZISTA 75 MG, COMPRIME PELLICULE PREZISTA 150 MG, COMPRIME PELLICULE PREZISTA 400 MG, COMPRIME PELLICULE PREZISTA 600 MG, COMPRIME PELLICULE PREZISTA 800 MG, COMPRIME PELLICULE PREZISTA 100 MG/ML, SUSPENSION BUVABLE (Ethanolate de darunavir) | <i>Pas de pictogramme grossesse</i> |
| RAPIFEN 1 MG (0,5 MG/ML), SOLUTION INJECTABLE RAPIFEN 5 MG (0,5 MG/ML), SOLUTION INJECTABLE (Chlorhydrate d'alfentanil) |  RAPIFEN + GROSSESSE = DANGER Ne pas utiliser chez la femme enceinte, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique |
| REMINYL 4 MG, COMPRIME PELLICULE REMINYL 8 MG, COMPRIME PELLICULE REMINYL 12 MG, COMPRIME PELLICULE REMINYL 4 MG/ML, SOLUTION BUVABLE REMINYL LP 8 MG, GELULE A LIBERATION PROLONGEE REMINYL LP 16 MG, GELULE A LIBERATION PROLONGEE REMINYL LP 24 MG, GELULE A LIBERATION PROLONGEE (Bromhydrate de galantamine) |  REMINYL + GROSSESSE = DANGER Ne pas utiliser chez la femme enceinte, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique |
| REOPRO 2 MG/ML, SOLUTION INJECTABLE OU POUR PERFUSION (abciximab) |  REOPRO + GROSSESSE = INTERDIT Ne pas utiliser chez la femme enceinte |
| RISPERDAL 1 MG, COMPRIME PELLICULE RISPERDAL 2 MG, COMPRIME PELLICULE RISPERDAL 4 MG, COMPRIME PELLICULE RISPERDAL 1 MG/ML, SOLUTION BUVABLE (Rispéridone) |  RISPERDAL + GROSSESSE = DANGER Ne pas utiliser chez la femme enceinte, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique |
| RISPERDALCONSTA LP 25 MG/2 ML, POUDRE ET SOLVANT POUR SUSPENSION INJECTABLE A LIBERATION PROLONGEE EN SERINGUE PREREMPLIE RISPERDALCONSTA LP 37,5 MG/2 ML, POUDRE ET SOLVANT POUR SUSPENSION INJECTABLE A LIBERATION PROLONGEE EN SERINGUE PREREMPLIE RISPERDALCONSTA LP 50 MG/2 ML, POUDRE ET SOLVANT POUR SUSPENSION INJECTABLE A LIBERATION PROLONGEE EN SERINGUE PREREMPLIE (Rispéridone) |  RISPERDAL CONSTA LP + GROSSESSE = DANGER Ne pas utiliser chez la femme enceinte, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique |
| SIBELIUM 10 MG, COMPRIME SECABLE (Chlorhydrate de flunarizine) |  SIBELIUM + GROSSESSE = DANGER Ne pas utiliser chez la femme enceinte, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique |
| SIRTURO 100 MG, COMPRIME (Bédaquiline) | <i>Pas de pictogramme grossesse</i> |
| SPORANOX 100 MG, GELULE SPORANOX 10 MG/ML, SOLUTION BUVABLE (Itraconazole) |  SPORANOX + GROSSESSE = INTERDIT Ne pas utiliser chez la femme enceinte et l'adolescente ou la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace. |
| STELARA 45 MG, SOLUTION INJECTABLE STELARA 45 MG, SOLUTION INJECTABLE EN SERINGUE PREREMPLIE STELARA 90 MG, SOLUTION INJECTABLE EN SERINGUE PREREMPLIE (Ustékinumab) | <i>Pas de pictogramme grossesse</i> |

| Spécialité (substance active) | Pictogramme grossesse associé |
|---|---|
| <p>SUFENTA 10 MICROGRAMMES/2 ML, SOLUTION INJECTABLE (I.V. OU PERIDURALE) SUFENTA 50 MICROGRAMMES/10 ML, SOLUTION INJECTABLE (I.V. OU PERIDURALE) SUFENTA 250 MICROGRAMMES/5 ML, SOLUTION INJECTABLE (I.V. OU PERIDURALE) EN AMPOULE (Citrate de sufentanil)</p> |  <p>SUFENTA + GROSSESSE = DANGER Ne pas utiliser chez la femme enceinte (excepté pour l'analgésie péridurale pendant l'accouchement), sauf en l'absence d'alternative thérapeutique</p> |
| <p>SYLVANT 100 MG, POUDRE POUR SOLUTION A DILUER POUR PERFUSION SYLVANT 400 MG, POUDRE POUR SOLUTION A DILUER POUR PERFUSION (Siltuximab)</p> |  <p>SYLVANT + GROSSESSE = DANGER Ne pas utiliser chez la femme enceinte et chez l'adolescente ou la femme en âge de procréer et sans contraception efficace, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique</p> |
| <p>TREVICTA 175 MG, SUSPENSION INJECTABLE A LIBERATION PROLONGEE TREVICTA 263 MG, SUSPENSION INJECTABLE A LIBERATION PROLONGEE TREVICTA 350 MG, SUSPENSION INJECTABLE A LIBERATION PROLONGEE TREVICTA 525 MG, SUSPENSION INJECTABLE A LIBERATION PROLONGEE (Palmitate de Palipéridone)</p> |  <p>TREVICTA + GROSSESSE = DANGER Ne pas utiliser chez la femme enceinte, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique</p> |
| <p>VELCADE 1 MG, POUDRE POUR SOLUTION INJECTABLE VELCADE 3,5 MG, POUDRE POUR SOLUTION INJECTABLE (Bortézomib (sous forme d'ester boronique de mannitol))</p> |  <p>VELCADE + GROSSESSE = DANGER Ne pas utiliser chez la femme enceinte et chez l'adolescente ou la femme en âge de procréer et sans contraception efficace, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique</p> |
| <p>XEPLION 25 MG, SUSPENSION INJECTABLE A LIBERATION PROLONGEE XEPLION 50 MG, SUSPENSION INJECTABLE A LIBERATION PROLONGEE XEPLION 75 MG, SUSPENSION INJECTABLE A LIBERATION PROLONGEE XEPLION 100 MG, SUSPENSION INJECTABLE A LIBERATION PROLONGEE XEPLION 150 MG, SUSPENSION INJECTABLE A LIBERATION PROLONGEE (Palmitate de palipéridone)</p> |  <p>XEPLION + GROSSESSE = DANGER Ne pas utiliser chez la femme enceinte, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique</p> |
| <p>ZYTIGA 250 MG, COMPRIME (Acétate d'abiratéron)</p> |  <p>ZYTIGA + GROSSESSE = INTERDIT Ne pas utiliser chez la femme enceinte, l'adolescente ou la femme en âge de procréer et sans contraception efficace</p> |