

## 患者向医薬品ガイド

2023年10月更新

ゼプリオン水懸筋注 25mg シリンジ  
ゼプリオン水懸筋注 50mg シリンジ  
ゼプリオン水懸筋注 75mg シリンジ  
ゼプリオン水懸筋注 100mg シリンジ  
ゼプリオン水懸筋注 150mg シリンジ

### 【この薬は？】

販売名	ゼプリオン 水懸筋注 25mg シリンジ XEPLION Aqueous Suspension for IM Injection	ゼプリオン 水懸筋注 50mg シリンジ XEPLION Aqueous Suspension for IM Injection	ゼプリオン 水懸筋注 75mg シリンジ XEPLION Aqueous Suspension for IM Injection	ゼプリオン 水懸筋注 100mg シリンジ XEPLION Aqueous Suspension for IM Injection	ゼプリオン 水懸筋注 150mg シリンジ XEPLION Aqueous Suspension for IM Injection
一般名	パリペリドンパルミチン酸エステル Paliperidone Palmitate				
含有量 (1シリンジ中)	パリペリドン パルミチン酸 エステル39mg (パリペリドン として25mg)	パリペリドン パルミチン酸 エステル78mg (パリペリドン として50mg)	パリペリドン パルミチン酸 エステル117mg (パリペリドン として75mg)	パリペリドン パルミチン酸 エステル156mg (パリペリドン として100mg)	パリペリドン パルミチン酸 エステル234mg (パリペリドン として150mg)

### 患者向医薬品ガイドについて

**患者向医薬品ガイド**は、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」  
<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

## 【この薬の効果は？】

- ・この薬は、精神神経用剤と呼ばれるグループに属する注射薬です。
- ・この薬は、脳内の神経伝達物質の受容体に作用してそのバランスを整えます。
- ・次の病気と診断された人に、医療機関において使用されます。

### 統合失調症

## 【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

○患者さんや家族の方は、以下について十分に理解できるまで説明を受けてください。

・高血糖（体がだるい、体重が減る、喉が渇く、水を多く飲む、尿の量が増えるなど）や低血糖（お腹がすく、冷汗が出る、血の気が引く、疲れやすい、手足のふるえ、けいれん、意識の低下）があらわれることがあります。

・高血糖や糖尿病の悪化により、糖尿病性ケトアシドーシスや糖尿病性昏睡状態（吐き気、甘酸っぱいにおいの息、深く大きい呼吸、意識の消失）などの重篤な状態になる可能性があります。

以上のような症状があらわれた場合には、ただちに受診してください。

○次の人は、この薬を使用することはできません。

- ・昏睡の状態にある人
- ・バルビツール酸誘導体などの中枢神経抑制剤の強い影響下にある人
- ・アドレナリン（アドレナリンをアナフィラキシーの救急治療、または歯科領域における浸潤麻酔もしくは伝達麻酔に使用する場合を除く）、クロザピンを使用している人
- ・過去にゼプリオン水懸筋注シリンジに含まれる成分およびパリペリドン、リスペリドンで過敏症のあった人
- ・腎臓に中等度以上の障害のある人


○次の人は、特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師に教えてください。

- ・心臓や血管の病気の人、低血圧の人、またはこれらが疑われている人
- ・過去に不整脈のあった人、先天性 QT 延長症候群の人、または心電図異常をおこすことが知られている薬を使用している人
- ・パーキンソン病の人、レビー小体型認知症の人
- ・てんかんなどのけいれんをおこす疾患を有する人、または今までにおこしたことがある人
- ・死にたいと強く思ったり考えたことがある人
- ・糖尿病の人または過去に糖尿病になったことがある人、血縁に糖尿病の人がいる人、高血糖の人、肥満の人など糖尿病になりやすい人
- ・脱水の人や栄養状態の悪い人
- ・長時間動かないでじっとしている人、長期間病床にある人、肥満の人、脱水状態の人
- ・腎臓に軽い障害のある人
- ・肝臓に障害のある人

- ・妊娠している人
  - ・授乳をしている人
- この薬には併用してはいけない薬 [アドレナリン(アナフィラキシーの救急治療、または歯科領域における浸潤麻酔もしくは伝達麻酔に使用する場合を除く) (ボスミン)、クロザピン (クロザリル) ]や併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

## 【この薬の使い方は？】

- ・この薬は注射薬です。
- ・使用量、使用回数、使用方法等は、あなたの症状などにあわせて、医師が決め、医療機関において肩か臀部の筋肉内に注射されます。
- ・通常、成人の使用量は次の通りです。



\*通常 75mg を使用します。症状などに応じ 25mg から 150mg の範囲で適宜増減されますが、増量される時は 1 回あたり 50mg を超えません。

## 【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・この薬は、投与後の効果が 4 週間持続します。効果が持続している間は常に副作用が起こる可能性があります。体に異常を感じたら、すぐに医療機関を受診し、この薬を使用していることを医師に伝えて下さい。  
ご家族など身近な人は、患者さんの状態の変化について注意して、もし体に異常が見られたら医療機関へ受診するように勧めてください。
- ・使用を始めてしばらくの間、再び使用する時、増量した時に、めまい、立ちくらみなどが起こることがあります。これらの症状があらわれたら、医師または薬剤師に相談してください。
- ・眠気、注意力・集中力・反射能力などの低下がおこることがあるので、自動車の運転などの危険を伴う機械の操作は行わないようにしてください。
- ・使用し始めて症状が悪化したら、医師または薬剤師に相談してください。
- ・高血糖や低血糖があらわれることがあるため、血糖値の検査がおこなわれることがあります。高血糖や糖尿病の悪化により、糖尿病性ケトアシドーシスや糖尿病性昏睡などがあらわれることがありますので、特に高血糖、肥満などの患者さんでは注意してください。これらの症状があらわれたらただちに受診してください。
- ・妊婦または妊娠している可能性がある人は医師に相談してください。

- ・授乳している人は医師に相談してください。
- ・アルコール飲料はこの薬に影響しますので、控えてください。
- ・白内障の手術を予定されている方は、白内障の手術中や手術後に目の合併症が起こることがありますので、この薬を使っていることを眼科医に伝えてください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を使用していることを医師または薬剤師に伝えてください。

## 副作用は？

特にご注意ください重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
悪性症候群 あくせいしょうこうぐん	高熱、汗をかく、ぼーっとする、手足のふるえ、からだのこわばり、話しづらい、よだれが出る、飲み込みにくい、脈が速くなる、呼吸数が増える、血圧が上昇する
遅発性ジスキネジア ちはつせいジスキネジア	意志に反して舌を動かしたり、出し入れしたり、絶えず噛むような口の動き、意志に反して体が動く
麻痺性イレウス まひせいイレウス	便やおならが出にくい、吐き気、嘔吐（おうと）、お腹が張る
抗利尿ホルモン不適合分泌症候群（SIADH） こうりょうホルモンふてきごうぶんびつしょうこうぐん（エスアイエーディーエイチ）	けいれん、意識の低下、意識の消失、吐き気、食欲不振
肝機能障害 かんきのうしょうがい	疲れやすい、からだがだるい、力が入らない、吐き気、食欲不振
黄疸 おうだん	白目が黄色くなる、皮膚が黄色くなる、尿の色が濃くなる、からだがかゆくなる
横紋筋融解症 おうもんきんゆうかいしょう	手足のこわばり、手足のしびれ、脱力感、筋肉の痛み、尿が赤褐色になる
不整脈 ふせいみやく	めまい、動悸、脈が遅くなる、気を失う、脈がとぶ
脳血管障害 のうけっかんしょうがい	突然の意識の低下、突然の意識の消失、突然片側の手足が動かしくくなる、突然の頭痛、突然の嘔吐、突然のめまい、突然しゃべりにくくなる、突然言葉が出にくくなる






高血糖 こうけつとう	体がだるい、体重が減る、喉が渇く、水を多く飲む、尿の量が増える
糖尿病性ケトアシドーシス とうりょうびょうせいケトアシドーシス	吐き気、甘酸っぱいにおいの息、深く大きい呼吸
糖尿病性昏睡 とうりょうびょうせいこんすい	吐き気、甘酸っぱいにおいの息、深く大きい呼吸、意識の消失
低血糖 ていけつとう	お腹がすく、冷汗が出る、血の気が引く、疲れやすい、手足のふるえ、けいれん、意識の低下
無顆粒球症 むかりゅうきゅうしゅう	突然の高熱、寒気、喉の痛み
白血球減少 はっけつきゅうげんしゅう	突然の高熱、寒気、喉の痛み
肺塞栓症 はいそくせんしゅう	胸の痛み、突然の息切れ
深部静脈血栓症 しんぶじょうみやくけっせんしゅう	発熱、皮膚が青紫～暗紫色になる、手足の爪が青紫～暗紫色になる、唇が青紫色になる、下肢のむくみ、下肢の痛み
持続勃起症 じぞくぼつきしゅう	陰茎および陰核の持続性勃起
アナフィラキシー	全身のかゆみ、じんま疹、喉のかゆみ、ふらつき、動悸、息苦しい

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	高熱、汗をかく、体のこわばり、意思に反して体が動く、けいれん、疲れやすい、体がだるい、力が入らない、体がかゆくなる、脱力感、体重が減る、冷汗が出る、突然の高熱、寒気、発熱、ふらつき
頭部	ぼーっとする、意識の低下、意識の消失、めまい、気を失う、突然の意識の低下、突然の意識の消失、突然の頭痛、突然のめまい、
顔面	血の気が引く、
眼	白目が黄色くなる
口や喉	話しづらい、よだれが出る、飲み込みにくい、意思に反して舌を動かしたり、出し入れしたり、絶えず嚙むような口に動き、吐き気、嘔吐、突然の嘔吐、突然しゃべりにくくなる、突然言葉が出にくくなる、喉が渇く、水を多く飲む、甘酸っぱいにおいの息、喉の痛み、唇が青紫色になる、喉のかゆみ、
胸部	呼吸数が増える、動悸、深く大きい呼吸、胸の痛み、突然の息切れ、息苦しい

部位	自覚症状
腹部	お腹が張る、食欲不振、お腹がすく、
手・足	手足のふるえ、脈が速くなる、手足のこわばり、手足のしびれ、脈が遅くなる、脈がとぶ、突然片側の手足が動かしにくくなる、手足の爪が青紫～暗紫色になる、下肢のむくみ、下肢の痛み
皮膚	皮膚が黄色くなる、皮膚が青紫～暗紫色になる、全身のかゆみ、じんま疹
筋肉	筋肉の痛み
生殖器	陰茎および陰核の持続性勃起
便	便やおならが出にくい
尿	尿の色が濃くなる、尿が赤褐色になる、尿量が増える
その他	血圧が上昇する

### 【この薬の形は？】

販売名	容器	性状
ゼプリオン水懸筋注 25mg シリンジ		白色の懸濁液
ゼプリオン水懸筋注 50mg シリンジ		
ゼプリオン水懸筋注 75mg シリンジ		
ゼプリオン水懸筋注 100mg シリンジ		
ゼプリオン水懸筋注 150mg シリンジ		

## 【この薬に含まれているのは？】

販売名	ゼプリオン 水懸筋注 25mg シリンジ	ゼプリオン 水懸筋注 50mg シリンジ	ゼプリオン 水懸筋注 75mg シリンジ	ゼプリオン 水懸筋注 100mg シリンジ	ゼプリオン 水懸筋注 150mg シリンジ
有効成分	パリペリドンパルミチン酸エステル				
添加剤	ポリソルベート 20、マクロゴール 4000NF、クエン酸水和物、無水リン酸一水素ナトリウム、リン酸二水素ナトリウム一水和物、水酸化ナトリウム				

## 【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：ヤンセンファーマ株式会社

(<https://www.janssen.com>)

メディカルインフォメーションセンター

電話（フリーダイヤル）：0120-183-279

FAX：0120-275-831