TECVAYLI® (teklistamab) ▼
Karta pacjenta

Należy zawsze nosić tę kartę przy sobie.
NALEŻY JĄ POKAZYWAĆ wszystkim pracownikom ochrony zdrowia zaangażowanym w leczenie pacjenta oraz w przypadku wizyty w szpitalu.

ZŁÓŻ TUTAJ

Lek TECVAYLI może powodować działania niepożądane, takie jak zespół uwalniania cytokin (CRS). Zespół uwalniania cytokin jest ciężką reakcją immunologiczną, która może być wywołana przez wiele czynników, w tym szereg leków.[1]

NAZWISKO PACJENTA:

_____

ZŁÓŻ TUTAJ

Ważne informacje dla pacjentów dotyczące bezpieczeństwa

Należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską, jeśli wystąpi którykolwiek z poniższych objawów:

- Gorączka (38°C lub wyższa)
- Dreszcze
- Szybkie bicie serca
- Trudności w oddychaniu
- Nudności
- Ból głowy
- Zawroty głowy

ZŁÓŻ TUTAJ

WAŻNE DO ZAPAMIĘTANIA: Należy pozostawać w pobliżu miejsca, w którym otrzymali Państwo leczenie lekiem TECVAYLI przez co najmniej 2 dni w celu codziennej kontroli po podaniu pierwszych trzech dawek (zwykle dwóch dawek wstępnych i pierwszej dawki podtrzymującej).[2]
Jeśli wystąpi **<u>którykolwiek</u>** z objawów wymienionych w tej karcie należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się po pomoc medyczną! Nie są to wszystkie możliwe działania niepożądane leku TECVAYLI. Należy poinformować lekarza, jeśli wystąpi jakiekolwiek działanie niepożądane, które niepokoi lub nie ustępuje.

Lekarz prowadzący

NAZWISKO LEKARZA PROWADZĄCEGO:

NUMER TELEFONU LEKARZA PROWADZĄCEGO:

NAZWA I ADRES SZPITALA:

NUMER TELEFONU:

ZŁÓŻ TUTAJ

Informacje do wypełnienia przez zespół terapeutyczny

Proszę przekazać tę kartę swojemu zespołowi terapeutycznemu, celem wypełnienia informacji i zwrócenia jej Panu/Pani.
Daty wstrzyknięć leku TECVAYLI (schemat stopniowego zwiększania dawki):

DAWKA STARTOWA 1

DAWKA STARTOWA 2

PIERWSZA DAWKA PODTRZYMUJĄCA*

*to jest pierwsza pełna dawka terapeutyczna (1,5 mg/kg)[2]

ZŁÓŻ TUTAJ

Ważne informacje dla pracowników ochrony zdrowia dotyczące bezpieczeństwa

Zespół uwalniania cytokin (CRS), w tym reakcje zagrażające życiu lub śmiertelne, mogą wystąpić u pacjentów otrzymujących produkt TECVAYLI.[2] Większość zdarzeń CRS obserwowanych po podaniu produktu TECVAYLI była stopnia 1. i 2.[2] CRS może dotyczyć wielu układów i narządów. Należy ocenić pacjenta pod kątem objawów przedmiotowych i podmiotowych CRS. Jeśli pacjent zgłasza jakiekolwiek objawy przedmiotowe lub podmiotowe wymienione w tej karcie, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym pacjenta w celu uzyskania dalszych informacji.

Pełne informacje znajdują się w Charakterystyce Produktu Leczniczego.[2]

ZŁÓŻ TUTAJ

▼ Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie.

1. Shimabukuro-Vornhagen A et al. J Immunother Cancer 2018;6(1):56.

2. Charakterystyka Produktu Leczniczego – TECVAYLI (teklistamab) lipiec 2022.

EM-106268
Lipiec 2022