

<p><b>Remicade</b> infliksymb</p> <p><b>Karta Przypominająca dla Pacjenta</b></p> <p>Imię i nazwisko pacjenta: Imię i nazwisko lekarza: Numer telefonu lekarza:</p> <p>Niniejsza karta przypominająca dla pacjenta zawiera ważne informacje, z których należy zdawać sobie sprawę przed rozpoczęciem i w trakcie leczenia lekiem Remicade.</p> <p>Niniejszą kartę należy okazywać każdemu lekarzowi prowadzącemu leczenie.</p> <p>Należy uważnie przeczytać „Ulotkę Informacyjną” leku Remicade przed rozpoczęciem leczenia tym lekiem.</p> <p>Data rozpoczęcia terapii lekiem Remicade:</p> <p>Bieżące podania:</p> <p>Ważne jest, aby pacjent i lekarz zapisali nazwę handlową i numer serii przyjmowanego leku.</p> <p>Należy poprosić lekarza o wpisanie typu i daty ostatniego badania w kierunku gruźlicy (TB):</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">Badanie</td> <td style="width: 50%;">Badanie</td> </tr> <tr> <td>Data</td> <td>Data</td> </tr> <tr> <td>Wynik:</td> <td>Wynik:</td> </tr> </table> <p>Udając się do fachowego personelu medycznego, należy zawsze mieć ze sobą listę wszystkich innych leków przyjmowanych przez pacjenta.</p> <p>Rodzaje uczuleń:</p> <p>Lista innych leków:</p>	Badanie	Badanie	Data	Data	Wynik:	Wynik:	<p><b>Zakażenia</b></p> <p><b>Przed leczeniem lekiem Remicade</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent ma infekcję nawet bardzo łagodną</li> <li>• Jest bardzo ważne, aby poinformować lekarza o przebytej gruźlicy lub bliskim kontakcie z osobą chorą na gruźlicę. Lekarz wykona badania w kierunku gruźlicy. Należy poprosić lekarza o zapisanie na karcie typu i daty ostatniego badania w kierunku gruźlicy</li> <li>• Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent choruje na wirusowe zapalenie wątroby typu B lub podejrzewa, że jest nosicielem wirusowego zapalenia wątroby typu B.</li> </ul> <p><b>W czasie leczenia lekiem Remicade</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Należy natychmiast zgłosić się do lekarza, jeśli pojawią się objawy infekcji. Objawy te obejmują: gorączkę, uczucie zmęczenia, (utrzymujący się) kaszel, duszność, utratę masy ciała, nocne poty, biegunkę, rany, problemy dotyczące zębów, uczucie pieczenia w trakcie oddawania moczu lub objawy grypopodobne.</li> </ul> <p><b>Ciąża, karmienie piersią i szczepienia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• W przypadku przyjmowania leku Remicade w okresie ciąży lub podczas karmienia piersią, ważne jest, aby poinformować o tym lekarza pediatrę przed podaniem dziecku jakiegokolwiek szczepionki. Dziecko nie powinno otrzymywać żadnej szczepionki zawierającej żywe drobnoustroje, takiej jak BCG (stosowanej w celu zapobiegania gruźlicy) w ciągu 12 miesięcy po porodzie, ani podczas karmienia piersią, chyba że lekarz, który zajmuje się dzieckiem zaleci inaczej.</li> </ul> <p>Kartę należy zachować przez 4 miesiące od daty przyjęcia ostatniej dawki leku Remicade lub w przypadku gdy kobieta jest w ciąży przez 12 miesięcy po porodzie. Działania niepożądane mogą wystąpić długo po przyjęciu ostatniej dawki leku Remicade.</p>
Badanie	Badanie						
Data	Data						
Wynik:	Wynik:						