

## **Písomná informácia pre používateľa**

### **SPORANOX kapsuly**

itrakonazol

**Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.**

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

**V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:**

1. Čo je Sporanox a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Sporanox kapsuly
3. Ako užívať Sporanox kapsuly
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Sporanox kapsuly
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

#### **1. Čo je Sporanox a na čo sa používa**

Sporanox je liek určený na liečbu infekcií pošvy, kože, ústnej dutiny, očí, nechtov alebo vnútorných orgánov spôsobených hubami.

#### **2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Sporanox kapsuly**

##### **Neužívajte Sporanox kapsuly**

- ak ste alergický na itrakonazol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
- ak ste tehotná (výnimočne však môže lekár Sporanox predpísať aj v takom prípade). Ak ste vo veku, keď môžete otehotnieť, používajte vhodné antikoncepčné opatrenia, aby ste sa ubezpečili, že neotehotniete počas liečby Sporanoxom. Pretože účinná látka pretrváva v tele ešte určitý čas po ukončení liečby, pokračujte v používaní antikoncepčných opatrení až po ďalšiu menštruáciu nasledujúcu po ukončení liečby kapsulami Sporanox.
- ak máte problémy so srdcom (známe ako kongestívne zlyhanie srdca), Sporanox môže stav zhoršiť. Ak váš lekár napriek tomu rozhodne, že máte užívať Sporanox, zabezpečte si rýchlú zdravotnícku pomoc, ak u seba spozorujete skrátenie dychu, nečakaný nárast hmotnosti, opuch nôh, nezvyčajnú únavu alebo sa začnete budiť v noci.

Neužívajte niektoré lieky, ak užívate Sporanox kapsuly. Existuje mnoho liekov, ktoré sa navzájom ovplyvňujú so Sporanox kapsulami. Prečítajte si „Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Sporanox kapsuly“ časť „Iné lieky a Sporanox“.

## Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnik predtým, ako začnete užívať Sporanox kapsuly.

- vždy povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak užívate akýkoľvek iný liek, pretože užívanie niektorých liekov spolu môže byť škodlivé.
- povedzte svojmu lekárovi, ak viete, že máte problémy s pečeňou. Môže byť potrebné upraviť dávku Sporanox kapsúl.
- prestaňte užívať Sporanox kapsuly a okamžite vyhľadajte lekára, ak sa počas liečby Sporanoxom u vás objavia niektoré z nasledujúcich príznakov: strata chuti do jedla, nevoľnosť, vracanie, únava, bolesť brucha, žltá farba kože alebo očí, svetlá stolica alebo veľmi tmavý moč. Ak užívate Sporanox, váš lekár môže požadovať pravidelné vyšetrenie krvi. Dôvodom je včasné vylúčenie porúch pečene, pretože sa tieto poruchy môžu veľmi zriedkavo vyskytnúť.
- povedzte svojmu lekárovi, ak máte poruchy srdca. Okamžite povedzte svojmu lekárovi, ak sa u vás objaví dýchavičnosť, neočakávané zvýšenie telesnej hmotnosti, opuch nôh, nezvyčajná únava alebo sa začínate prebúdať v noci, pretože toto môžu byť príznaky srdcového zlyhania.
- povedzte svojmu lekárovi, ak máte poruchu obličiek. Môže byť potrebné upraviť dávku Sporanox kapsúl.
- povedzte svojmu lekárovi alebo okamžite vyhľadajte lekársku pomoc, ak máte závažnú alergickú reakciu (charakterizovanú závažnou kožnou vyrážkou, svrbením, žihľavkou, ťažkosťami s dýchaním a/alebo opuchom tváre) počas užívania Sporanox kapsúl.
- prestaňte užívať Sporanox kapsuly a okamžite informujte svojho lekára, ak zostanete precitlivení na slnečné svetlo.
- prestaňte užívať Sporanox kapsuly a okamžite informujte svojho lekára, ak sa u vás objavia závažné kožné ochorenia ako napríklad rozšírená vyrážka s odlupujúcou sa kožou a pľuzgieri v ústach, na očiach a na pohlavných orgánoch, alebo vyrážka s malými vriedkami alebo pľuzgiermi.
- prestaňte užívať Sporanox kapsuly a informujte okamžite svojho lekára, ak spozorujete akékoľvek pocity brnenia, zníženie citlivosti alebo slabosť v končatinách alebo iné problémy s nervami v rukách alebo nohách.
- povedzte svojmu lekárovi, ak ste zaznamenali alergickú reakciu na Sporanox alebo na nejaké iné antimykotikum.
- ak máte cystickú fibrózu, povedzte to svojmu lekárovi pred začatím liečby Sporanox kapsulami.
- povedzte svojmu lekárovi, ak máte neutropéniu (nedostatok určitého druhu bielych krviniek), AIDS, alebo ste sa podrobili transplantácii. Pravdepodobne bude potrebné upraviť dávkovanie Sporanox kapsúl.
- ak pociťujete akékoľvek príznaky straty sluchu, prestaňte užívať Sporanox kapsuly a ihneď to oznámte svojmu lekárovi. Vo veľmi zriedkavých prípadoch bola u pacientov užívajúcich Sporanox zaznamenaná dočasná alebo trvalá strata sluchu.
- povedzte svojmu lekárovi, ak je váš zrak rozmazaný alebo vidíte dvojmo, ak počujete zvonenie v ušiach, ak stratíte schopnosť kontrolovať svoj moč alebo močíte viac než obvykle.

## Iné lieky a Sporanox

Ak užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Niektoré lieky sa nesmú užívať spolu v rovnakom čase a ak sa užívajú v rovnakom čase, musia sa vykonať úpravy (napr. dávky).

*Liečivá, ktoré sa nikdy nesmú užívať, ak užívate Sporanox:*

- terfenadín, astemizol a mizolastín; na alergiu;
- bepridil, felodipín, nisoldipín, lerkanidipín, ivabradín, ranolazín, eplerenón; na liečbu angíny pectoris (zvieravá bolesť na hrudi pri ochorení srdca) alebo vysokého krvného tlaku;
- tikagrelor; na spomalenie zrážavosti krvi;
- cisaprid; na liečbu tráviacich ťažkostí;
- simvastatín, lovastatín; ktoré znižujú cholesterol;
- midazolam (užívaný cez ústa), triazolam; lieky na spanie;

- lurasidon, pimozid, sertindol; užívané pri psychotických poruchách
- levacetylmetylmetadol (levometadyl), metadón;
- halofantrín, na liečbu malárie;
- irinotekan, liek proti rakovine;
- námeľové alkaloidy vrátane dihydroergotamínu alebo ergotamínu; používané na liečbu migrenózných bolestí hlavy;
- ergometrín (ergonovín) alebo metylergometrín (metylergonovín); používané na kontrolu krvácania a udržanie stiahnutia maternice po pôrode;
- disopyramid, dronedarón, chinidín, dofetilid; na liečbu nepravidelnej srdcovej činnosti;
- domperidón, na liečbu nevoľnosti a vracania.

Skôr ako začnete užívať niektoré z týchto liečiv, počkajte najmenej 2 týždne po vysadení Sporanox kapsúl.

*Liečivá, ktoré môžu znížiť účinok Sporanox kapsúl:*

- karbamazepín, fenytoín, fenobarbital; na liečbu epilepsie;
- rifampicín, rifabutín, izoniazid; na liečbu tuberkulózy;
- efavirenz, nevirapín; na liečbu HIV/AIDS.

Ak užívate niektoré zo spomenutých liečiv, povedzte o tom svojmu lekárovi, aby sa vykonali potrebné opatrenia.

Skôr ako začnete užívať niektoré z týchto liečiv, počkajte najmenej 2 týždne po vysadení Sporanox kapsúl.

*Liečivá, ktoré sa neodporúčajú, okrem prípadov, kedy sú podľa vášho lekára nevyhnutné:*

- axitinib, dabrafenib, dasatinib, ibrutinib, nilotinib, sunitinib, trabectedín; na liečbu rakoviny;
- aliskiren, na liečbu vysokého krvného tlaku;
- sildenafil, keď sa používa na liečbu pľúcnej hypertenzie (zvýšeného tlaku krvi v cievach v pľúcach);
- rifabutín, na liečbu tuberkulózy;
- karbamazepín, na liečbu epilepsie;
- kolchicín, na liečbu dny;
- konivaptan, tolvaptan, na liečbu nízkej hladiny sodíka v krvi;
- darifenacín, na liečbu inkontinencie moču;
- everolimus, podávaný po transplantácii orgánov;
- fentanyl, silné liečivo na liečbu bolesti;
- apixaban, rivaroxaban; na spomalenie zrážavosti krvi;
- salmeterol, na zlepšenie dýchania;
- simeprevir, na liečbu hepatitídy C;
- tamsulozín, na liečbu inkontinencie moču u mužov;
- vardenafil, na liečbu erektilnej dysfunkcie.

Skôr ako začnete užívať niektoré z týchto liečiv, počkajte najmenej 2 týždne po vysadení Sporanox kapsúl, okrem prípadov, kedy je ich užívanie podľa vášho lekára nevyhnutné.

*Liečivá, ktoré môžu vyžadovať zmenu dávky (nielen Sporanoxu kapsúl ale aj iných liečiv):*

- ciprofloxacín, klaritromycín, erytromycín, telitromycín; antibiotiká;
- bosentan, digoxín, nadolol, riociguat a niektoré blokátory kalciového kanála vrátane verapamilu; ktoré účinkujú na srdce alebo cievy;
- kumaríny, cilostazol, dabigatran, ktoré spomaľujú zrážavosť krvi;
- metylprednizolón, budesonid, ciklesonid, flutikazón alebo dexametazón (liečivá užívané cez ústa, injekčne alebo vdychovaním pri liečbe zápalov, astmy a alergií);

- cyklosporín, takrolimus, temsirolimus alebo rapamycín (taktiež známy ako sirolimus), ktoré sa zvyčajne podávajú po transplantácii orgánov;
- maravirok a inhibítory proteázy: indinavir, ritonavir, darunavir posilnený ritonavírom, fosamprenavir posilnený ritonavírom, sachinavir; používané na liečbu HIV/AIDS;
- telaprevir, používaný na liečbu vírusu hepatitídy C;
- bortezomib, busulfán, docetaxel, erlotinib, gefitinib, imatinib, ixabepilon, lapatinib, ponatinib, trimetrexát, vinca alkaloidy; používané na liečbu nádorových ochorení;
- buspiron, perospiron, ramelteon, midazolam IV, alprazolam, brotizolam; na liečbu úzkosti alebo na spanie;
- alfentanyl, buprenorfín, oxykodón, sufentanil; silné liečivá na liečbu bolesti;
- repaglinid, saxagliptin; na liečbu cukrovky;
- aripiprazol, haloperidol, kvetiapín, risperidón; na liečbu psychóz;
- aprepitant; na liečbu nevoľnosti a vracania;
- fesoterodín, imidafenacín, oxybutynín, solifenacín, tolterodín; na kontrolu podráždeného močového mechúra;
- sildenafil, tadalafil; na liečbu erektilnej dysfunkcie (porucha erekcie);
- prazikvantel, na liečbu motolice a pásomnice;
- bilastín, ebastín; na alergiu;
- reboxetín, na liečbu depresie;
- atorvastatín, na zníženie cholesterolu;
- meloxicam, na liečbu zápalu a bolesti kĺbov;
- cinakalcet, na liečbu nadmernej aktivity prištítnych teliesok;
- mozavaptan; na liečbu nízkej hladiny sodíka v krvi;
- alitretinoín (užívaný cez ústa), na liečbu ekzému;
- eletriptan, na liečbu migrenóznej bolesti hlavy;
- telitromycín, na liečbu pneumónie.

Povedzte svojmu lekárovi, ak užívate niektoré zo spomínaných liečiv.

Aby sa Sporanox kapsuly v tele primerane vstrebali, musí byť v žalúdku dostatočné množstvo kyseliny. Z tohto dôvodu sa majú lieky, ktoré neutralizujú žalúdočnú kyselinu, užiť najmenej 1 hodinu pred užitím Sporanox kapsúl alebo sa nemajú užiť skôr, ako 2 hodiny po podaní Sporanox kapsúl. Z toho istého dôvodu, ak užívate lieky, ktoré znižujú tvorbu žalúdočnej kyseliny, zapite kapsuly Sporanox nediétnymi cola nápojmi. V prípade akýchkoľvek pochybností sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom.

### **Tehotenstvo a dojčenie**

Ak ste tehotná, Sporanox neužívajte.

Ak ste v plodnom veku a môžete otehotnieť, používajte antikoncepcné opatrenia, aby ste sa uistili, že neotehotniete, kým užívate tento liek. Keďže Sporanox zostáva v tele určitý čas po ukončení liečby, pokračujte po ukončení liečby Sporanoxom v používaní antikoncepcných opatrení do ďalšieho menštruačného cyklu.

Ak dojčíte, pred začatím užívania lieku Sporanox sa poraďte so svojím lekárom; malé množstvo lieku Sporanox môže preniknúť do materského mlieka.

### **Vedenie vozidiel a obsluha strojov**

Sporanox môže niekedy spôsobiť závrat, rozmazané/dvojité videnie alebo stratu sluchu. Ak pociťujete tieto príznaky, neved'te vozidlá ani neobsluhujte stroje.

### **Sporanox obsahuje sacharózu.**

Ak vám lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

### 3. Ako užívať Sporanox kapsuly

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste ničím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Sporanox vždy užívajte hneď po hlavnom jedle, pretože týmto spôsobom účinkuje lepšie. Celé kapsuly zapite malým množstvom vody.

Dávkovanie a dĺžka podávania lieku Sporanox závisia od typu plesne, ktorú máte a od miesta infekcie. Lekár presne určí, ako máte liek užívať.

Najčastejšie sa používajú nasledujúce dávkovacie režimy:

TYP INFEKČIE	POČET KAPSÚL ZA DEŇ	ČASOVÝ INTERVAL								
<i>Vaginálne infekcie</i>	2 kapsuly 2-krát denne alebo 2 kapsuly 1-krát denne	1 deň 3 dni								
<b><i>Infekcie kože: lekár podľa vašich individuálnych potrieb zvolí dávku a trvanie liečby</i></b>										
	1 alebo 2 kapsuly 1-krát alebo 2-krát denne	7 až 15 dní								
	Ak sú postihnuté dlane rúk alebo chodidlá nôh, potrebujete užívať Sporanox po dobu 30 dní.									
<i>Infekcie ústnej dutiny</i>	1 kapsula 1-krát denne	15 dní								
<i>Infekcie oka</i>	2 kapsuly 1-krát denne	21 dní								
<i>Infekcie vnútorných orgánov</i>	1 – 4 kapsuly denne	dlhodobá liečba								
<b><i>Infekcie nechtov: lekár podľa vašich individuálnych potrieb zvolí neprerušovanú alebo pulznú liečbu</i></b>										
- Neprerušovaná liečba infekcií nechtov na nohách	2 kapsuly 1-krát denne	3 mesiace								
- Pulzná liečba infekcií nechtov	2 kapsuly 2-krát denne	1 týždeň								
	Potom sa Sporanox na 3 týždne prestane užívať. Celý cyklus sa opakuje, jedenkrát pri infekcii nechtov na rukách a dvakrát pri infekcii nechtov na nohách (s infekciou alebo bez prítomnosti infekcie nechtov na rukách) (pozri nasledujúcu tabuľku).									
<b>Miesto infekcie</b>	1. týždeň	2. týždeň	3. týždeň	4. týždeň	5. týždeň	6. týždeň	7. týždeň	8. týždeň	9. týždeň	10. týždeň
Len INFEKČIE NECHTOV NA RUKÁCH	2 kapsuly 2-krát denne	bez užívania Sporanoxu	Sporanoxu	2 kapsuly 2-krát denne						KONIEC LIEČBY
INFEKČIE NECHTOV NA NOHÁCH s infekciou nechtov na rukách alebo bez nej	2 kapsuly 2-krát denne	bez užívania Sporanoxu	Sporanoxu	2 kapsuly 2-krát denne	bez užívania Sporanoxu				2 kapsuly 2-krát denne	KONIEC LIEČBY

**Infekcie kože:** Pri kožných infekciách poškodenie úplne vymizne za niekoľko týždňov po ukončení liečby Sporanox kapsulami. Je to typické pre plesňové infekcie: liek ničí samotné plesne, príznaky choroby však vymiznú až pri obnove zdravej kože.

**Infekcie nechtov:** Narušený necht odrastie v priebehu 6 - 9 mesiacov po ukončení liečby Sporanox kapsulami, pretože liek zničí len samotnú pleseň. Necht potrebuje dorásť potom, čo je pleseň v postihnutom nechte zničená, čo trvá aj niekoľko mesiacov. Preto sa neznepokojujte, ak počas liečby nepozorujete očividné zlepšenie: liečivo zostáva vo vašich nechtoch niekoľko mesiacov a postupne pôsobí na pleseň. Preto ukončíte liečbu len podľa určenia lekára a to aj vtedy, keď nepozorujete výrazné zlepšenie.

**Infekcie vnútorných orgánov:** môžu vyžadovať vyššie dávky Sporanox kapsúl a dlhšiu liečbu.

Vždy dodržiavajte pokyny lekára, ktorý môže prispôbiť liečbu vašim osobným potrebám.

**Ak užijete viac kapsúl Sporanoxu, ako máte**

Ak užijete príliš veľkú dávku lieku Sporanox, okamžite vyhľadajte lekára, ktorý vykoná nevyhnutné opatrenia.

*Informácia pre lekára v prípade predávkovania*

*V prípade náhodného predávkovania liečba pozostáva z podporných opatrení.*

*Ak je to potrebné, môže sa podať aktívne uhlie. Itrakonazol nie je možné odstrániť pomocou hemodialýzy.*

*Nie je dostupné žiadne špecifické antidotum.*

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnik.

#### **4. Možné vedľajšie účinky**

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak počas liečby Sporanoxom zaznamenáte niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov:

**Časté (postihujú menej ako 1 z 10 ľudí):**

- bolesť brucha, žalúdočná nevoľnosť, bolesť hlavy.

**Menej časté (postihujú menej ako 1 zo 100 ľudí):**

- môže sa vyskytnúť precitlivenosť na Sporanox kapsuly. Môžete ju rozpoznať podľa vyrážky na koži, svrbenia, žihľavky, skrátenia dychu alebo ťažkosti s dýchaním a/alebo opuchu tváre.
- porucha menštruácie,
- ochorenie pečene, v súvislosti s ktorým sa môže vyskytnúť jeden alebo niekoľko z nasledujúcich príznakov: strata chuti do jedla, nevoľnosť, vracanie, pocit únavy, bolesť brucha, žltacka, veľmi tmavý moč a svetlo sfarbená stolica.
- žihľavka, kožná vyrážka, svrbivá vyrážka,
- zápal prínosových dutín, nádcha, kašeľ a prechladnutie,
- zápcha, hnačka, plynatosť, vracanie, porucha trávenia.

**Zriedkavé (postihujú menej ako 1 z 1000 ľudí):**

- zvýšenie hodnôt pečeňových testov (preukáže sa to v krvných testoch),
- strata schopnosti udržať moč alebo potreba močiť častejšie,
- problémy so zrakom vrátane rozmazaného a dvojitého videnia,
- zmena chuti, tras, znížená citlivosť v končatinách, pocit mravčenia v končatinách alebo iné problémy s nervami v rukách alebo nohách.
- niektoré poruchy krvi, čo môže viesť k zvýšenému riziku infekcií,

- zvonenie v ušiach,
- strata sluchu (môže byť trvalá),
- závažná bolesť hornej časti žalúdka, často spojená s nevoľnosťou a vracaním (zápal pankreasu),
- opuch z dôvodu zadržiavania tekutín,
- sťažené dýchanie,
- nezvyčajné vypadávanie alebo stenčenie vlasov (alopécia),
- vysoké hladiny triglyceridov v krvi (preukáže sa to v krvných testoch), červená, svrbiaca, šupinatá alebo odlupujúca sa koža, kožné vyrážky,
- precitlivosť kože na svetlo,
- poruchy erekcie.

### **Hlásenie vedľajších účinkov**

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná ul. 11, SK-825 08 Bratislava 26, Tel: + 421 2 507 01 206, e-mail: [neziaduce.ucinky@sukl.sk](mailto:neziaduce.ucinky@sukl.sk). Tlačivo na hlásenie nežiaduceho účinku je na webovej stránke [www.sukl.sk](http://www.sukl.sk) v časti Bezpečnosť liekov/Hlásenie o nežiaducich účinkoch. Formulár na elektronické podávanie hlásení: <https://portal.sukl.sk/eskadra/>. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

## **5. Ako uchovávať Sporanox kapsuly**

Sporanox kapsuly uchovávajúte pri teplote 15 až 30 °C. Chráňte pred svetlom.

Tento liek uchovávajúte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume expirácie, ktorý je uvedený na obale po „Použiteľné do: (mesiac/rok)“. Dátum expirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

## **6. Obsah balenia a ďalšie informácie**

### **Čo Sporanox obsahuje**

- Liečivo je itrakonazol (100 mg v jednej kapsule).
- Ďalšie zložky sú mikrogranuly sacharózy (pozostávajúce zo sacharózy, kukuričného škrobu a čistenej vody), hydroxypropylmetylcelulóza, makrogol, indigokarmín E132, oxid titaničitý E171, želatína, sodná soľ erytrozínu E127.

### **Ako vyzerá Sporanox a obsah balenia**

Sporanox sa dodáva vo forme ružovo-modrých kapsúl. Jedno balenie obsahuje 4, 15 alebo 28 tvrdých želatínových kapsúl.

### **Držiteľ rozhodnutia o registrácii**

Johnson & Johnson, s.r.o.  
Karadžičova 12, 821 08 Bratislava  
Slovenská republika

**Výrobca**

Janssen-Cilag S.p.A.

Borgo S. Michele, Latina, Taliansko

**Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v januári 2020.**